



PROČ NEočkovat proti *rakovině děložního čípku?*

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
strun@natur.cuni.cz

VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

KNIHCENTRUM.cz

KVADOS

CERTIFIKÁT



Nejprodávanejší

odborná a populárně naučná kniha pro dospělé
v síti KNIHCENTRUM.cz za rok 2011.

Doba jedová
Strunecká, J. Patočka

nakladatelství

TRITON



Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

europrint CPI Česká knihovna audi-teka.cz KNIHCENTRUM.cz

CERTIFIKÁT

Nejprodávanejší

odborná a populárně naučná literatura pro dospělé
v síti KNIHCENTRUM.cz za rok 2012.


Doba jedová 2

Anna Strunecká

Jiří Patočka

nakladatelství

Nakladatelství
TRITON



KNIHCENTRUM.cz

Sárka Benešová
manuální administrativní práce
www.KNIHCENTRUM.cz

HPV vakcíny – konstrukty virů

Gardasil/Silgard (Merck Sharp & Dohme)
2006

Tetravalentní HPV 16, 18, 6, 11
225 µg hliníku (AAHS – amorfni aluminum hydroxysulfát)

Cervarix (GSK – Glaxo Smith Kline) září
2007

HPV 16,18
500 µg hliníku (ASO4 – hydroxid hlinitý + monofosforyl lipid)

ONE LESS



You could become one less affected by cervical cancer!



Ask your doctor about Gardasil

IMPORTANT INFORMATION ABOUT GARDASIL

GARDASIL is the only vaccine that can help guard against diseases caused by HPV Types 16 and 18, which cause 70% of cervical cancer cases, and HPV Types 6 and 11, which cause 90% of genital warts cases.

GARDASIL works when given before there is any contact with HPV Types 6, 11, 16, and 18. That's why it's important that you talk with your doctor or healthcare professional about getting GARDASIL, now – not later.

GARDASIL is given in 3 separate visits 6 months apart and can cause some swelling, itching, and redness at the injection site, fever, nausea, and dizziness. Talk to your doctor or healthcare professional for details if GARDASIL is right for you.



Billie March 1000000000



AVENIER
OČKOVACÍ CENTRUM



Je to pouze na Vás.

OČKOVÁNÍ PROTI RAKOVINĚ
DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

Nová cena pouze **5.940,-Kč**

Více informací v ordinaci

Původci rakoviny děložního čípku

**16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59;
68; 73; 82**

http://www.gfmer.ch/Medical_education_En/Cameroon_2007/pdf/HPV_vaccine_Fokoua_Yaounde_2007.pdf).

Imunologové uvádějí, že při potlačení HPV 16 a 18 se jiné kmeny HPV mohou stát agresivnějšími.

Vznik rakoviny děložního čípku

- Nakažení HPV virem je běžné u 75 – 80 % žen.
- 90 % infekce organismus zvládne v průběhu 2–3 let, z toho 67 % během 12 měsíců
- U 3 – 5 % dospělých žen se odhaduje výskyt stadia prekancerózy CIN (cervical intraepithelial neoplasia), přičemž může i spontánně zmizet.
- Karcinom se postupně vyvíjí po 10 až více než 15 let přes jednotlivé stupně dysplazie až do pravé prekancerózy.
- Díky screeningu lze více než 80 % případů zachytit ve stadiu CIN1.
- V UK 12. příčina úmrtí na rakovinu u žen

Účinnost tetravalentní vakcíny

Léze a typ HPV	Očkováná skupina	Kontroly (placebo)	Účinnost v %
Cervikální léze CIN1	Počet případů/ počet subjektů	Počet případů/ počet subjektů	
HPV 16	6/6448	97/6257	94
HPV 18	1/7158	47/7092	97,9
Vaginální léze VIN1			
HPV 16	0/6455	7/6269	100
HPV 18	0/7190	2/7119	100
Kondylomata			
HPV 6 nebo 11	2/6718	186/6647	98,9

CIN1 vs. NÚ HPV vakcíny

Typ dysplázie	Počet/10 000 žen	Studie	NÚ Počet/10 000 žen
CIN1 HPV 16	155	PATRICIA	752
CIN1 HPV 18	66	FUTURE I	179
VIN1 HPV 16	11	Harper et al.	414
VIN1 HPV 18	3	ISLALAB	245

NÚ HPV vakcín

1. Mdloby nazývané „**psychogenní událost**“. Je to mdloba spojená se ztrátou vědomí, poruchami vidění, záškuby končetin (prý jsou často zaměňovány s křečemi), třesem končetin, problémy s dýcháním a hyperventilací.
2. Bolest a otok v místě vpichu.

NÚ HPV vakcín

Vážné NÚ zahrnovaly abnormální průběh těhotenství, spontánní potraty a abnormální vývoj plodu, poruchy krevního a lymfatického systému, poruchy jater a žlučníku, poruchy imunitního systému, srdečně-cévní příhody, gastrointestinální poruchy, poruchy nervového systému, psychiatrické potíže, poruchy ledvin a vylučovacího ústrojí, hrudní a dýchací, onemocnění kůže a podkožních tkání, infekční onemocnění, poruchy rozmnožování a problémy s prsy, poruchy jater a vylučování žluči, svalové a pohybové problémy, zranění a intoxikace. V souboru 21 916 očkovaných žen bylo celkem 825 případů vážných NÚ (3,8 %).

HPV Vaccine VAERS Reports

červen 2012

Nežádoucí účinek	Počet
Invalidita	886
Úmrtí	116
Nevratné účinky	5373
Abnormální Pap	490
Rakovina čípku	56
Návštěva pohotovosti	9 747
Hospitalizace	2714
Nežádoucí účinky celkem	26 328

Počet NÚ HPV vakcín v porovnání s jinými vakcínami

NÚ po Gardasilu tvoří 61 % ze všech vážných hlášených NÚ po veškerých očkováních žen do 30 let.

Počty úmrtí představují 62 %.

NÚ život ohrožující po Gardasilu představují 65 %.

Počty trvalé neschopnosti tvoří 82 % všech hlášených případů NÚ.

Celkový počet NÚ po vakcíně Cervarix je v UK až 104 × vyšší než u všech ostatních vakcín z anglického očkovacího kalendáře dohromady!

V Austrálii zaznamenali v roce 2008 rekordní roční výskyt NÚ v poměru 7,3/100 000 očkovaných. Bylo to o 85 % více než v roce 2003 a tento nárůst jde na vrub očkování 12–26letých dívek a žen HPV vakcínami.

ONE MORE

GIRL

Ms. Jasmine, a teenager, died in her sleep.



Annabelle Morin

<http://vaccineliberationarmy.com/category/rooms/gardasil-hpv-vaccine/>

Vážné NÚ

- poruchy nervového systému včetně RS
- akutní encefalomyelitis
- syndrom opsoklonus myoklonus
- brachiální neuritida
- ztráta zraku
- pankreatitida
- anafylaxe
- tachykardie
- autoimunitní nemoci (např. cerebrální vaskulitida)
- Úmrtí

Autoimunitní cerebrální vaskulitida

Tomljenovic a Show 2006–2012

Synkopa	3127	14,2 %
Závratě	3012	13,7 %
Migrény a bolesti hlavy	2385	10,9 %
Nevolnost	2147	9,8 %
Únava	1100	5 %
Záchvaty křečí	923	4,2%
Třes	531	2,4 %
Úzkost, psychotické symptomy	256	1,2 %
Postižení paměti a poznávání	164	0,8 %
Cerebrální vaskulitida	5	0,02 %

Okres	Počet C53 / 100 000 žen	Srovnatelné s
Prachatice	3,9	Nejlepší na světě
Benešov	4,3	Austrálie
Chrudim	7,6	Francie, Velká Británie, Irsko
Kutná Hora, Plzeň – sever	8, 0	dtto
Pelhřimov, Příbram, Opava	8,2 –8,8	dtto
Vsetín, Jeseník, Šumperk	9,4–9,6	Čína
Semily, Nymburk	10,5 –10,9	Vietnam
Strakonice, Česká Lípa, Olomouc	11,1 –11,8	dtto
Praha	20,6	Pákistán
Jablonec nad Nisou, Klatovy, Chomutov	32,5	Nepál
Liberec, Hodonín	33,8	Nigérie
Ústí nad Orlicí , Teplice	36,9	Ghana
V ČR žádný kraj	47,5	Uganda
Česká republika	19,2	Pákistán

Stále se totiž neví

- Jak dlouho se udrží imunita po očkování ?
Klesá po 5 letech, po 8 letech již 14 % žen nemá protilátky
- Jak se budou chovat kmeny HPV, které nejsou obsažené ve vakcíně (je jich asi 20).
Nepovede očkování proti HPV 16 a 18 ke zvýšení infekce ostatními kmeny? Některá pozorování tuto možnost spíš podporují.
- Jak bude HPV vakcína působit u žen, které již jsou infikovány?
- Nebude se zvyšovat pravděpodobnost NÚ?



Vakcíny HPV nebyly dostatečně testovány u dětí pod 15 let. Jejich podávání dětem mladším než 15 roků je veliký veřejný experiment.
D. Harper

GSK: Omezení rakoviny děložního čípku v důsledku vakcinace bude trvat roky a dekády. **GSK vypracoval model ve spolupráci s CDC, aby se zjistilo, zda Cervarix může ovlivnit incidenci rakoviny a s ní spojených úmrtí u žen a dívek v USA.** (28 úmrtí ve studiích, 59 abnormálních těhotenství)

Diane Harperová: Za situace, kdy 90 % žen bude očkováno sníží se za 15 let incidence na **14/100 000**.

NÚ po aplikaci „placeba“ v podobě Al^{3+}

Studie	Zdroj financování	Placebo Obsah Al^{3+} /zdroj	Počet subjektů	Počet NÚ	Počet NÚ/ 10 000 subj
FUTURE I	Merck	225 µg AAHS	2672	45	168
FUTURE II	Merck	225 µg AAHS	6031	56	93
Harper et al.	GSK	500 µg $\text{Al}(\text{OH})_3$	538	19	353
Koutsky, Mao	Merck	225 µg AAHS	1198	3	25
PATRICIA	GSK	500 µg $\text{Al}(\text{OH})_3$	9325	705	756
Munoz et al.	Merck	225 µg AAHS	1902	7	37
Villa et al.	Merck	225 µg AAHS	274	2	73
Celkem			21940	837	381

KURKUMIN – kurkuma dlouhá



Zcela bezpečný bez
vedlejších účinků

Protizánětlivé,
protirakovinné, antioxidační
působení

Alzheimerova nemoc,
Parkinsonova nemoc

**Chelatační vlastnosti –
detoxifikace kovů**






*Děkuji vám
za pozornost*

Kontaminace HPV vakcín fragmenty DNA

Září 2011 **September 2011:** Recombinant HPV DNA L1 gene DNA fragments, possibly attached to the aluminum adjuvant, were discovered in 100% of Gardasil samples tested.

Stanovisko FDA k nálezu fragmentů DNA ve všech šaržích HPV vakcín (<http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm276859.htm>).

Uvádí v něm, že fragmenty DNA se ve vakcíně vyskytují v důsledku technologického postupu při výrobě vakcíny, avšak nejsou považovány za kontaminanty a nepředstavují pro očkované žádné nebezpečí





Srpen 2012: HPV-16 L1 gene DNA fragments of vaccine origin apparently attached to aluminum adjuvant particles were also discovered in post mortem blood and spleen samples of a girl who died 6 months after Gardasil injections

February 2013: It was discovered that the naked HPV 16 L1 gene fragments bound to aluminum particles by ligand exchange in Gardasil have acquired a non-B conformation. This conformational change may have stabilized the HPV 16 gene fragments in Gardasil preventing their normal enzymatic degradation in vaccine recipients.[\[10\]](#), [\[11\]](#) Non-B DNA conformations and their relationship to diseases has been studied since the 1960's. Based on current scientific knowledge, the human genetic consequences of these non-B DNA structures are approximately 20 neurological diseases, approximately 50 genomic disorders and several psychiatric diseases.[\[12\]](#), [\[13\]](#) The impact of injected foreign non-B DNA on human health is totally unknown.

outube.com/watch?v=FUa19tLdwh

Dr. Hanan Polansky, in his highly acclaimed "Purple" book explains how certain foreign DNA fragments, at high concentrations, cause major diseases, such as, [cancer](#), [heart disease](#), [diabetes](#), [autoimmune diseases](#), and [even obesity](#) even when the DNA is broken and not functioning.

<http://www.ys>



[Ron Dagan, MD](#), is Professor of Pediatrics and Infectious Diseases at the Ben-Gurion University of the Negev in Beer-Sheva, Israel, and Director of the Pediatric Infectious Disease Unit at the Soroka University Medical Center. His expert advice to Israel's Advisory Committee regarding potential HPV vaccine implementation is as follows:

We are dealing with injections, some of which given in 3 [separate] doses, which are delivered to teenage girls. **Many side effects are to be expected.** During the week following the vaccine delivery of the injections many serious events which are ***not*** related/linked to the vaccination are expected: **fainting, deaths and convulsions/fits.** This needs to be taken into account. Even if it is not rational, **if these events happen in class they may damage the general perception/status of the vaccinations.** This is happening all over the world all the time. **In relation to the side effects, we need to be prepared in advance** and not simply react after the fact.